

11.4. TXERTOEN TERMO-EGONKORTASUNA

TXERTOIA	BILTEGIRATZE TEMPERATURA			OHARRAK
	2-8° C	22-25° C	35-37° C	
BCG Tuberkulosia	Iraungipen-data	% 20-30eko galera progresiboa 3 hilabetean	% 20ko galera progresiboa 3-14 egunean	* Argiaren eraginpetik babestu. Ez da izoztu behar.
Polioa, aho bidezkoa VPO	Iraungipen-data	Ez egonkorra. % 50eko jarduera-galera 20 egunean	Oso ez egonkorra. Titulu onargarrien galera 1-3 egun igaro ondotik	Izoztu egin daiteke. Argiaren eraginpetik babestu.
Polio inaktibatua VPI	Iraungipen-data	1 motako antígeno-maila jaitsi egiten da 20. egunetik aurrera	1 motako antígeno-maila jaitsi egiten da 20. egunetik aurrera	Ez da izoztu behar. Argiaren eraginpetik babestu behar da.
DTP/DTPa/dTpa	Iraungipen-data	astebete	*	Ez da izoztu behar. Bota, izoztu bada.
Td Ditanrix	Iraungipen-data	72 ordu	*	Ez da izoztu behar. Bota, izoztu bada.
Txerto hirukoitz birikoa Priorix	Iraungipen-data	72 ordu	*	Argiaren eraginpetik babestu. Ez da izoztu behar. Bota, izoztu bada.
B hepatitis A Engerix®	Iraungipen-data	astebete	72 ordu	Ez da izoztu behar. Bota, izoztu bada.
A hepatitis A Havrix	Iraungipen-data	72 ordu	Ez dago eskuragarri	Ez da izoztu behar. Bota, izoztu bada.
A+B hepatitis	Iraungipen-data	astebete	Ez dago eskuragarri	Bota, izoztu bada.
Tifoide inaktibatua Typherix	Iraungipen-data	astebete	*	
C meningokoziko konjugatua (Meningitec®)	Iraungipen-data	Egonkorra 3 hilabete	Ez da 25°C baino gehiagoan egon behar 24 ordu baino gehiagoan	
C meningokoziko konjugatua (Menjugate®)	Iraungipen-data	Egonkorra 6 hilabete	Liofilizadoreak egonkor eusten dio 3 hilabetez 30°C graduan, eta disolbatzaileak 18 hilabetez 30°C graduan.	Ez da izoztu behar eta ez da 2°C azpitik egon behar. Ez eduki argitan.
C meningokoziko konjugatua (Neisvac C)	Iraungipen-data	Egonkorra 9 hilabete	Egonkor 30 egunez tenperatura honetan: < 40°C	

TXERTOA	BILTEGIRATZE TEMPERATUA				OHARRAK
	2-8° C	22-25° C	35-37° C	>37° C	
Mencecax ACWY	Iraungipen-data	72 ordu	72 ordu	*	Egonkor izoztu ondoren.
Nimenrix	Iraungipen-data	Astebete	Astebete	*	Egonkor izoztu ondoren.
Gripea	Iraungipen-data	Ez gainditu sekula temperatura hau: 20°C		*	Ez da izoztu behar. Ez eduki argitan.
Barizela Varilrix	Iraungipen-data	24 ordu		*	Egonkor izoztu ondoren.
<i>Haemophilus influenzae b</i> Hiberix	Iraungipen-data	Astebete	Astebete	*	Egonkor izoztu ondoren.
Prevenar 13	Iraungipen-data	4 egun		*	Ez da izoztu behar.
Synflorix	Iraungipen-data	Astebete		*	
Neumokoko polisakaridoa	Iraungipen-data	Egonkor hainbat astez		*	Ez da izoztu behar.
Hexavalente Infanrix-hexa®	Iraungipen-data	72 ordu		*	Ez da izoztu behar. Argia ekidin.
Pentavalente Infanrix-IPV-Hib	Iraungipen-data	72 ordu		*	Ez da izoztu behar. Ez eduki argitan.
Pentavalente Pentavac®	Iraungipen-data	14 egun		*	Ez da izoztu behar. Argia ekidin.
VPH Gardasil®	Iraungipen-data	130 hilabete		*	> 42°C 3 hilabetez. Ez gainditu temperatura hau: 50°C
Cervarix	Iraungipen-data	astebete		*	
Rota Teq	Iraungipen-data	48 ordu 26-30°C: 12 ordu		*	Ez dago eskuragarri.
Rotarix	Iraungipen-data	astebete		*	Egonkor izoztean.

* Informazioa ez dago eskuragarri.

Bibliografia:

1. Temperature sensitivity of vaccines. Department of Immunization, Vaccines and Biologicals. Family and Community Health. World Health Organization. 2006.
2. Kim Causer. South East London. Vaccine Incident Working Group. May 2005.
3. Murcia Salud. Osasun eta Kontsumo sailburuordetza.
<http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/125571-TEV08062015.pdf>
4. Txertoen biltegitratzeari buruzko informazioa. GSKlaborategia.