

18 hilabeterekin, 5 gaixotasunetatik babestuko duten **txerto bat** jarriko zaio bisitan:

- Difteriaren, Tetanosaren, Kukurtxeztularen, PoliomiELITISAREN eta Haemophilus influenzae b-ren (Hib) aurkako txerto konbinatua.




Gaixotasunen eta txertoen ondorioen alderaketa

Gaixotasuna	Gaixotasunaren ondorioak	Txertoaren eraginkortasuna*	Ondorio kaltegarriak
Difteria	Arnasteko arazoak. Nerbio-sistemari, bihotzari edo giltzurrunei eragin diezaieke, paralisia. (Kasuen %6-10ean) heriotza.	%99,8	Mina, gogortasuna, gorritasuna injekzioaren eremuan. Sukarra, negarra, suminkortasuna, gose-galera (%10).
Tetanosa	Muskuluen espasmo minkorrak, muskuluen zurruntasuna, arnasteko zailtasuna, irensteko zailtasuna. (Kasuen %10ean) heriotza.	%100	
Kukurtxeztula	Eztulaldi paroxistikoa arnasteko zailtasunarekin. Kongestioa eta okadak. Pneumoniak, konbultsioak, entzefalopatiak (11.000 kasutik bat). Heriotza (bularreko haurren %0,4).	%100	
PoliomiELITISA	Sukarra, goragalea, okadak, pixkanakako paralisia (%1). Paralisi iraunkorra (ospitaleratutako kasuen %50-a). Heriotza (ospitaleratutako kasuen %5-a).	%99,3	
Haemophilus influenzae b	Epiglotitisa, osteomiELITISA, pneumonia, meningitisa, heriotza (meningitis kasuen %5).	%96,6	

* 3 dosirekin, antigorputzen maila azken dositik hilabetera



CALENDARIO VACUNAL INFANTIL DE EUSKADI 2016



Difteria

Tétanos

Tos ferina

PoliomiELITIS

Haemophilus influenzae b