



OSITOLOSALDEA

Programa de detección precoz de cáncer colorrectal





| OSI TOLOSALDEA | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPIA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----|----------------------|----|---------------------|----|----------------------|-----|---------------------|----|-----------|----|-----------------------------------|---|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA RIESGO MEDIO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| 2012 | 15.218 | 69,04% | 5,71% | 565 | 5,10% | 26,55% | 150 | 4,60% | 26 | 16,81% | 95 | 25,66% | 145 | 16,11% | 91 | 8,32% | 47 | 1,59% | 9 |
| 2014 | 14.815 | 73,01% | 5,65% | 569 | 14,67% | 35,85% | 204 | 8,61% | 49 | 16,70% | 95 | 24,96% | 142 | 8,61% | 49 | 3,69% | 21 | 1,23% | 7 |
| 2016 | 10.353 | 75,79% | 4,92% | 354 | 6,30% | 36,44% | 129 | 6,78% | 24 | 25,42% | 90 | 14,69% | 52 | 10,45% | 37 | 5,37% | 19 | 0,56% | 2 |
| 2017 | 5.121 | 74,03% | 4,54% | 156 | 1,99% | 37,82% | 59 | 7,05% | 11 | 15,38% | 24 | 17,95% | 28 | 13,46% | 21 | 7,05% | 11 | 1,28% | 2 |
| 2018 | 10.125 | 74,63% | 3,64% | 257 | 3,51% | 38,91% | 100 | 5,84% | 15 | 22,18% | 57 | 21,01% | 54 | 7,39% | 19 | 3,50% | 9 | 1,17% | 3 |
| 2019 | 4.924 | 72,26% | 3,63% | 118 | 0,00% | 39,83% | 47 | 2,54% | 3 | 19,49% | 23 | 25,42% | 30 | 6,78% | 8 | 5,93% | 7 | 0,00% | 0 |
| 2020 | 3.782 | 72,66% | 3,71% | 96 | 0,00% | 47,92% | 46 | 2,08% | 2 | 17,71% | 17 | 23,96% | 23 | 4,17% | 4 | 2,08% | 2 | 2,08% | 2 |
| 2021 | 12.460 | 74,23% | 4,18% | 335 | 1,06% | 46,17% | 158 | 2,27% | 8 | 16,58% | 57 | 21,55% | 70 | 5,88% | 18 | 4,48% | 14 | 2,24% | 7 |
| 2022 | 3.973 | 71,96% | 3,18% | 81 | 0,00% | 46,91% | 38 | 8,64% | 7 | 17,28% | 14 | 17,28% | 14 | 6,17% | 5 | 3,7 | 3 | 0,00% | 0 |

| OSI TOLOSALDEA | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN % | POSITIVOS % | Nº PERSONAS COLONOSCOPIA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA % | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|---------------------|------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------|------|
| | | | | | | ADENOMA RIESGO MEDIO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | LESIÓN AVANZADA (AMR+AAR) | | LESIÓN AVANZADA FRAGMENTADA | | CARCINOMA | |
| | | | | | | % | % | % | % | % | % | | | | |
| 2023 | 12.710 | 72,32 | 3,79 | 297 | 1,68 | 68 | 22,90 | 18 | 6,06 | 86 | 28,96 | 0 | 0 | 15 | 5,05 |

| 2012 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPIA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|------------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA RIESGO MEDIO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UAP VILLABONA | 3.368 | 66,92% | 6,08% | 128 | 0,78% | 32,81% | 42 | 7,81% | 10 | 13,28% | 17 | 29,69% | 38 | 10,16% | 13 | 4,69% | 6 | 1,56% | 2 |
| UAP ANDOAIN | 3.653 | 70,98% | 6,21% | 154 | 4,19% | 24,03% | 37 | 4,55% | 7 | 16,23% | 25 | 30,52% | 47 | 14,94% | 23 | 9,09% | 14 | 0,65% | 1 |
| UAP ALEGIA | 1.486 | 67,97% | 5,94% | 57 | 12,06% | 22,81% | 13 | 0,00% | 0 | 19,30% | 11 | 19,30% | 11 | 24,56% | 14 | 10,53% | 6 | 1,75% | 1 |
| UAP IBARRA | 2.001 | 74,46% | 5,10% | 71 | 13,51% | 29,58% | 21 | 9,86% | 7 | 16,90% | 12 | 16,90% | 12 | 12,68% | 9 | 12,68% | 9 | 1,41% | 1 |
| UAP TOLOSA | 4.710 | 74,46% | 5,25% | 155 | 3,13% | 23,87% | 37 | 1,29% | 2 | 19,35% | 30 | 23,87% | 37 | 20,65% | 32 | 7,74% | 12 | 2,58% | 4 |
| TOTAL 2012 | 15.218 | 69,04% | 5,71% | 565 | 5,10% | 26,55% | 150 | 4,60% | 26 | 16,81% | 95 | 25,66% | 145 | 16,11% | 91 | 8,32% | 47 | 1,59% | 9 |

| 2014 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPIA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|------------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA RIESGO MEDIO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UAP VILLABONA | 3.331 | 71,96% | 5,38% | 115 | 20,66% | 36,52% | 42 | 6,96% | 8 | 14,78% | 17 | 24,35% | 28 | 7,83% | 9 | 6,96% | 8 | 1,74% | 2 |
| UAP ANDOAIN | 3.495 | 74,59% | 5,91% | 146 | 13,43% | 37,67% | 55 | 10,27% | 15 | 15,75% | 23 | 23,29% | 34 | 8,90% | 13 | 2,05% | 3 | 1,37% | 2 |
| UAP ALEGIA | 1.464 | 67,76% | 7,66% | 75 | 13,25% | 42,67% | 32 | 8,00% | 6 | 16,00% | 12 | 25,33% | 19 | 5,33% | 4 | 2,67% | 2 | 0,00% | 0 |
| UAP IBARRA | 1.902 | 74,92% | 5,33% | 70 | 14,67% | 35,71% | 25 | 11,43% | 8 | 14,29% | 10 | 25,71% | 18 | 7,14% | 5 | 2,86% | 2 | 2,86% | 2 |
| UAP TOLOSA | 4.623 | 73,46% | 5,18% | 163 | 12,21% | 30,67% | 50 | 7,36% | 12 | 20,25% | 33 | 26,38% | 43 | 11,04% | 18 | 3,68% | 6 | 0,61% | 1 |
| TOTAL 2014 | 14.815 | 73,01% | 5,65% | 569 | 14,67% | 35,85% | 204 | 8,61% | 49 | 16,70% | 95 | 24,96% | 142 | 8,61% | 49 | 3,69% | 21 | 1,23% | 7 |

| 2016 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPIA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA RIESGO MEDIO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UAP ANDOAIN | 3.420 | 76,23% | 5,06% | 120 | 8,95% | 32,50% | 39 | 7,50% | 9 | 20,00% | 24 | 17,50% | 21 | 12,50% | 15 | 8,33% | 10 | 0,83% | 1 |
| UAP VILLABONA | 3.485 | 77,50% | 5,04% | 120 | 3,25% | 38,33% | 46 | 5,83% | 7 | 25,83% | 31 | 13,33% | 16 | 11,67% | 14 | 5,00% | 6 | 0,00% | 0 |
| UAP ALEGIA | 1.506 | 71,18% | 4,20% | 44 | 6,52% | 38,64% | 17 | 9,09% | 4 | 22,73% | 10 | 25,00% | 11 | 2,27% | 1 | 2,27% | 1 | 0,00% | 0 |
| UAP IBARRA | 1.942 | 75,54% | 4,98% | 70 | 6,85% | 38,57% | 27 | 5,71% | 4 | 35,71% | 25 | 5,71% | 4 | 10,00% | 7 | 2,86% | 2 | 1,43% | 1 |
| TOTAL 2016 | 10.353 | 75,79% | 4,92% | 354 | 6,30% | 36,44% | 129 | 6,78% | 24 | 25,42% | 90 | 14,69% | 52 | 10,45% | 37 | 5,37% | 19 | 0,56% | 2 |

| 2017 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPIA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA RIESGO MEDIO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UAP TOLOSA | 5.121 | 74,03% | 4,54% | 156 | 1,99% | 37,82% | 59 | 7,05% | 11 | 15,38% | 24 | 17,95% | 28 | 13,46% | 21 | 7,05% | 11 | 1,28% | 2 |
| TOTAL 2017 | 5.121 | 74,03% | 4,54% | 156 | 1,99% | 37,82% | 59 | 7,05% | 11 | 15,38% | 24 | 17,95% | 28 | 13,46% | 21 | 7,05% | 11 | 1,28% | 2 |

| 2018 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPIA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA RIESGO MEDIO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| UAP ANDOAIN | 3.278 | 73,98% | 3,82% | 91 | 3,45% | 39,56% | 36 | 8,79% | 8 | 18,68% | 17 | 24,18% | 22 | 4,40% | 4 | 3,30% | 3 | 1,10% | 1 |
| UAP VILLABONA | 3.541 | 76,32% | 3,53% | 84 | 4,88% | 35,71% | 30 | 4,76% | 4 | 17,86% | 15 | 22,62% | 19 | 9,52% | 8 | 7,14% | 6 | 2,38% | 2 |
| UAP ALEGIA | 1.507 | 71,60% | 4,81% | 50 | 3,57% | 40,00% | 20 | 4,00% | 2 | 30,00% | 15 | 16,00% | 8 | 10,00% | 5 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| UAP IBARRA | 1.799 | 74,99% | 2,61% | 32 | 0,00% | 43,75% | 14 | 3,13% | 1 | 31,25% | 10 | 15,63% | 5 | 6,25% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| TOTAL 2018 | 10.125 | 74,63% | 3,64% | 257 | 3,51% | 38,91% | 100 | 5,84% | 15 | 22,18% | 57 | 21,01% | 54 | 7,39% | 19 | 3,50% | 9 | 1,17% | 3 |

| 2019 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPIA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|----------|--------------|----------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA MEDIO RIESGO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| UAP TOLOSA | 4.924 | 72,26% | 3,63% | 118 | 0,00% | 39,83% | 47 | 2,54% | 3 | 19,49% | 23 | 25,42% | 30 | 6,78% | 8 | 5,93% | 7 | 0,00% | 0 |
| TOTAL 2019 | 4.924 | 72,26% | 3,63% | 118 | 0,00% | 39,83% | 47 | 2,54% | 3 | 19,49% | 23 | 25,42% | 30 | 6,78% | 8 | 5,93% | 7 | 0,00% | 0 |

| 2020 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPIA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|----------|--------------|----------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA MEDIO RIESGO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| UAP VILLABONA | 3.782 | 72,66% | 3,71% | 96 | 0,00% | 47,92% | 46 | 2,08% | 2 | 17,71% | 17 | 23,96% | 23 | 4,17% | 4 | 2,08% | 2 | 2,08% | 2 |
| TOTAL 2020 | 3.782 | 72,66% | 3,71% | 96 | 0,00% | 47,92% | 46 | 2,08% | 2 | 17,71% | 17 | 23,96% | 23 | 4,17% | 4 | 2,08% | 2 | 2,08% | 2 |

| 2021 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPIA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA MEDIO RIESGO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| UAP ALEGIA | 1.714 | 74,04% | 5,20% | 63 | 1,64% | 41,27% | 26 | 4,76% | 3 | 14,29% | 9 | 20,63% | 13 | 7,94% | 5 | 6,35% | 4 | 3,17% | 2 |
| UAP ANDOAIN | 3.777 | 75,72% | 4,72% | 116 | 1,68% | 57,76% | 67 | 4,31% | 5 | 13,79% | 16 | 14,66% | 17 | 4,31% | 5 | 3,45% | 4 | 1,72% | 2 |
| UAP IBARRA | 2.084 | 73,08% | 3,28% | 44 | 0,00% | 45,45% | 20 | 0,00% | 0 | 15,91% | 7 | 25,00% | 11 | 6,82% | 3 | 4,55% | 2 | 2,27% | 1 |
| UAP TOLOSA | 4.885 | 74,08% | 3,51% | 112 | 0,93% | 40,18% | 45 | 0,00% | 0 | 22,32% | 25 | 25,89% | 29 | 4,46% | 5 | 3,57% | 4 | 1,79% | 2 |
| TOTAL 2021 | 12.460 | 74,23% | 4,18% | 335 | 1,06% | 46,17% | 158 | 2,27% | 8 | 16,58% | 57 | 21,55% | 70 | 5,88% | 18 | 4,48% | 14 | 2,24% | 7 |

| 2022 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPIA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | | | ADENOMA RIESGO MEDIO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | LESIÓN AVANZADA (AMR+AAR) | | LESIÓN AVANZADA FRAGMENTADA | | CARCINOMA | |
| UAP BILLABONA | 3.973 | 71,96% | 3,18% | 81 | 0,00% | 14 | 17,28% | 5 | 6,17% | 19 | 23,46% | 0 | 0,00% | 3 | 3,70% |
| TOTAL 2022 | 3.973 | 71,96% | 3,18% | 81 | 0,00% | 14 | 17,28% | 5 | 6,17% | 19 | 23,46% | 0 | 0,00% | 3 | 3,70% |

| 2023 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN % | POSITIVOS % | Nº PERSONAS COLONOSCOPIA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA % | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|----------|-------------|-------------|
| | | | | | | ADENOMA RIESGO MEDIO % | | ADENOMA ALTO RIESGO % | | LESIÓN AVANZADA (AMR+AAR) % | | LESIÓN AVANZADA FRAGMENTADA % | | CARCINOMA % | |
| UAP ALEGIA | 1.757 | 71,43 | 4,06 | 47 | 0 | 11 | 23,40 | 3 | 6,38 | 14 | 29,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAP ANDOAIN | 3.832 | 73,17 | 3,89 | 96 | 4,17 | 16 | 16,67 | 3 | 3,13 | 19 | 19,79 | 0 | 0 | 6 | 6,25 |
| UAP IBARRA | 1.987 | 74,13 | 4,01 | 47 | 0 | 10 | 21,28 | 7 | 14,89 | 17 | 36,17 | 0 | 0 | 3 | 6,38 |
| UAP TOLOSA | 5.134 | 71,29 | 3,52 | 107 | 0,93 | 31 | 28,97 | 5 | 4,67 | 36 | 33,64 | 0 | 0 | 6 | 5,61 |
| TOTAL 2023 | 12.710 | 72,32 | 3,79 | 297 | 1,68 | 68 | 22,90 | 18 | 6,06 | 86 | 28,96 | 0 | 0 | 15 | 5,05 |